

お薬説明文書

第3類医薬品 食塩錠「タイヨー」の効能・効果、用法・用量を変更いたしました。

*従来品には、用法・用量に本剤の最高用量が記載されておりましたため過量服用による副作用防止の目的で「上手な飲み方」を製品外箱に追記しておりましたが、承認事項一部変更承認申請を実施し、2017年5月製造出荷以降の製品からは「効能・効果」、「用法・用量」を以下の内容に変更することと致しました。

*従来品を既にご購入のお客様に関しましては上手な飲み方をご参照いただくことで副作用等の問題はございませんのでその旨ご了承いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

上手な飲み方

- 本剤 1～2錠につき 250～500mL／回の、水を摂取してください。
- 高温多湿な場所での運動や労働で汗を多くかく方は、発汗量に合わせて本剤の服用量を調節してください。

変更点

	変更後	変更前									
有効成分	本剤 1錠中 塩化ナトリウム 0.5g	40錠中、塩化ナトリウム(食塩)20g									
用法・用量	<p>成人（15歳以上）は、次の場合に下記の用法・用量で服用してください</p> <p>※屋内外に限らず気温や湿度が高い時、熱帯夜の翌日 ※工事現場など、高温・多湿の職場環境で作業を行う時 ※運動場や体育館などで激しい運動を行う時</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1回量</th> <th>服用方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>最小服用量</td> <td>1錠 食塩相当量 0.5g</td> <td>100mL（コップ1/2杯分）の水でそのまま 又は溶かして服用してください</td> </tr> <tr> <td>発汗量が多い場合 (流れるような汗をかく場合)</td> <td>2錠 食塩相当量 1.0g</td> <td>200mL（コップ1杯分）の水でそのまま 又は溶かして服用してください</td> </tr> </tbody> </table> <p>1日最大14錠（7g）の間で服用量を調節してください</p>		1回量	服用方法	最小服用量	1錠 食塩相当量 0.5g	100mL（コップ1/2杯分）の水でそのまま 又は溶かして服用してください	発汗量が多い場合 (流れるような汗をかく場合)	2錠 食塩相当量 1.0g	200mL（コップ1杯分）の水でそのまま 又は溶かして服用してください	成人（15歳以上）1回4錠、1日10回を限度とし、服用する
	1回量	服用方法									
最小服用量	1錠 食塩相当量 0.5g	100mL（コップ1/2杯分）の水でそのまま 又は溶かして服用してください									
発汗量が多い場合 (流れるような汗をかく場合)	2錠 食塩相当量 1.0g	200mL（コップ1杯分）の水でそのまま 又は溶かして服用してください									
効能・効果	運動や高温多湿による発汗時の食塩（塩化ナトリウム）の補給	食塩喪失時の補給									

製造販売元

大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷 3-14-16

本書は、お薬を正しくご購入いただくための説明文書です。