

使用期限：

製造番号：

第2類医薬品 瀉下剤
(下剤)

日本薬局方
加香ヒマシ油

Aromatic Castor Oil

第2類医薬品 瀉下剤
(下剤)

日本薬局方
加香ヒマシ油

Aromatic Castor Oil

加香ヒマシ油「コサカイP」

20mL



2012年4月改訂(記載変更要項に伴う改訂等)
この説明事項は、本剤のご使用前に必ずお読みください。なお、必要とき認めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化し副作用が起こりやすくなる]

1. 次の人は服用しないでください。
 - (1) はげしい腹痛又は吐き気、嘔吐のある人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 3歳未満の乳幼児
 - (4) 防虫剤(ナフタリン等)、殺虫剤(備イラズ等)等の薬剤を誤って服用した人(このような場合は、直ちに医師の治療を受けてください。)
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
 - 駆虫薬、他の瀉下剤(下剤)
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください。
4. 適用しないでください。

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 薬物の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー一症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢



発売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16
製造販売元
小堺製薬株式会社
東京都墨田区両国4-36-39

効能・効果
腸内内容物の急速な排除(食あたり等)
用法・用量

大人(15歳以上) 1回・・・20mL
11歳以上～15歳未満 1回・・・13mL
7歳以上～11歳未満 1回・・・10mL
3歳以上～7歳未満 1回・・・6mL
いずれも1日1回を限度として、そのまま又は水・牛乳などに浮かせて必要時服用する。

〔用法・用量に関連する注意〕
1. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
2. 就寝前の服用をさけてください。

本品20mL中、ヒマシ油19.8mL、ハッカ油0.1mL、オレンジ油0.1mLを含有します。

【保存及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 瓶の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

大洋製薬お客様相談窓口

☎ 0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日・祝祭日除く)

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

第2類医薬品 瀉下剤
(下剤)

日本薬局方
加香ヒマシ油

Aromatic Castor Oil

加香ヒマシ油「コサカイP」

20mL



発売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16
製造販売元
小堺製薬株式会社
東京都墨田区両国4-36-39



4 975175 010603



紙



外箱 プラ キャップ

ガラス：瓶

E12-TS