

第2類医薬品

日本薬局方  
複方ヨード・グリセリン

50mL



第2類医薬品

咽喉塗布剤

日本薬局方  
複方ヨード・グリセリン

Compound Iodine Glycerin

50mL



製造販売元  
大洋製薬株式会社  
東京都文京区本郷3-14-16

成分・分量

本品1000mL中	
日局 ヨウ素	12g
日局 ヨウ化カリウム	24g
日局 グリセリン	900mL
日局 ハッカ水	45mL
日局 液状フェノール	5mL
日局 精製水	適量

保管及び取扱い上の注意

- 1) 小児の手のとどかない所に保管すること
- 2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- 3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
- 4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと
- 5) 使用中に薬液がこぼれ衣服等が着色したら、すぐに水洗し、落ちにくい場合は、チオ硫酸ナトリウム（ハイポ）の液で洗うこと



ガラス：瓶

大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時（土・日曜、祝祭日は除く）

副作用被害救済制度

☎0120-149-931



4 975175 011051

108- TS

副産品

台墨取簿

第2類医薬品

咽喉塗布剤

日本薬局方  
複方ヨード・グリセリン

Compound Iodine Glycerin

50mL



製造販売元  
大洋製薬株式会社  
東京都文京区本郷3-14-16

本剤の使用前に、この外箱の説明事項を必ずお読みください。また、必要なとき読めるよう大切に保管してください。

使用上の注意

相談すること

- 1) 次の人を使用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - 1) 医師の治療を受けている人
  - 2) 本剤またはヨウ素に対し過敏症の既往歴のある人
  - 3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 4) 甲状腺の疾患のある人
  - 5) 口内のひびいたれがある人
- 2) 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談すること
  - 1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	悪心
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けること

症状の名称	症 状
アナフィラキシー	胸苦しさ、むくみ、じんましん、様症状
アレルギー	発疹等があらわれる。

- 2) 5～6日間使用しても症状の改善がみられない場合

効能・効果

のどの殺菌・消毒

用法・用量

適宜、適量を患部に塗布する

（用法・用量に関連する注意）

- 1) 定められた用法・用量を厳守すること
- 2) 塗布用のみ使用し、内服しないこと
- 3) のどに塗るとき、綿等に薬液をしみこませ過ぎないように注意すること
- 4) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流すこと。なお、症状が重い場合には眼科専門医の診察を受けること
- 5) 薬液や薬液をしみこませた綿等を誤って飲み込んだ時は、直ちに医師の診察を受けること
- 6) 小児に使用させる場合には特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること