

第3類医薬品

日本薬局方
希コードチンキ

50mL

開栓注意

本剤の使用前に、この外箱の説明事項を必ずお読みください。また、必要なとき読めるよう大切に保管してください。

▲ 使用上の注意

※ 相談すること

- 1) 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 1) 医師の治療を受けている人
 - 2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 4) 患部が広範囲の人
 - 5) 深い傷やひどいやけどの人
- 2) 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
アナフィラキシー	胸苦しさ、むくみ、じんましん、腫脹等があらわれる

- 2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

創傷面の殺菌・消毒

用法・用量

適量を1日数回患部に塗布する

(用法・用量に関連する注意)

- 1) 定められた用法・用量を厳守すること
- 2) 外用にのみ使用し、内服しないこと
- 3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- 4) 口唇等の粘膜の部分、口の中、目のまわりには使用しないこと
- 5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- 6) 本製品をお使いになるときは、脱脂綿・綿棒等を使用し、患部に軽く塗布すること
- 7) マークキュロクロム液を同じ患部に使用しないこと

第3類医薬品

日本薬局方
希コードチンキ

Dilute Iodine Tincture

50mL



製造販売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16

成分・分量	
本品100mL中	
日局 ヨウ素	3 g
日局 ヨウ化カリウム	2 g
日局 エタノール	73.4mL
日局 精製水	適量

保管及び取扱い上の注意

- 1) 小児の手のとかない所に保管すること
- 2) 直射日光及び火気を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- 3) 瓶用をきき、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
- 4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと
- 5) 開栓注意：容器のフタを開けると、液がこぼれることがあるので、注意すること
- 6) 使用中に製液がこぼれ衣服等が着色したら、すぐに水洗し、落ちにくい場合は、チオ硫酸ナトリウム（ハイポ）の液で洗うこと。液がこぼれて服などに着くと落ちにくくなるので、フタを開けるときは注意すること

火気厳禁

大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931



外箱



キャップ

ガラス：瓶



4 975175 011037

第3類医薬品

日本薬局方
希コードチンキ

Dilute Iodine Tincture

50mL



製造販売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16

108-TS

商標出典

各墨取簿