

本剤の使用前に、この説明事項を必ずお読みください。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと

- (1) 患部が広範囲の人
- (2) 深い傷やひどいやけどの人

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒

用法・用量

1日数回、適量を患部に直接塗布または脱脂綿、ガーゼ等に浸して塗布する

指定医薬部外品 100mL

オキシエイド

(Oxydol)

きずの洗浄・消毒

きずは直ちに洗浄・消毒 酸素の泡で「傷口」洗う



製造販売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口

☎️ 0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)

販売名:オキシエイド

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること
- (2) 外用にのみ使用し、内服しないこと
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科専門医の診療を受けること
- (4) 小児に使用させる場合には特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること

成分・分量

本品は過酸化水素 2.5～3.5 W/v%を含む
添加物:フェナセチン、エタノール

保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない30℃以下の所に密栓して保管すること
- (3) 保存中は容器の圧力が高くなっていることがあるので、容器の口を顔に向けぬようにして、キャップをあけること
- (4) 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと



キャップ
ボトル
外装フィルム

製造番号

使用期限



E09-FL