

# ポビドンヨードの消毒液

ボビエイド  
**Povi Aid**  
50mL

ボビエイドの有効成分「ポビドンヨード」は、各種の細菌、真菌、ウィルスに対し幅広く優れた殺菌・消毒効果を発揮します。本品はエタノールを含有していないため、**しみにくい**製剤となっております。

## 用法・用量

1日数回患部に塗布する。

<用法・用量に関する注意>

- 1) 本剤は外用だけに使用し、内服、うがいや粘膜の洗浄・消毒には使用しないこと
- 2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科専門医の診療を受けること
- 3) 石けん等との併用は本剤の洗浄・消毒作用を弱める事があるので、石けん水を洗い落としてから使用すること
- 4) 定められた用法・用量を厳守すること
- 5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること

## 成分・分量

本品100mL中 ポビドンヨード 10g  
(有効ヨウ素 1.0g)

添加物: クリセリン、クエン酸水和物、リソ酸水素Na水和物、クエン酸Na水和物

## 保管及び取扱い上の注意

- 1) 直射日光をさけ、なるべく温気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- 2) 小児の手のとどかない所に保管すること
- 3) 調用をされ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
- 4) 漱液や衣服等に着色し水で落ちにくい場合は、チオ硫酸ナトリウム(ハイポ)の液を用いて洗うこと。ただし、ハイポの液は稀に色落ちの原因になる事もあるので、必ず目立たない部分でお試しいただき使用すること
- 5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

## 指定医薬部外品

# 傷の洗浄・消毒に ポビドンヨードの消毒液

ボビエイド  
**Povi Aid**



50mL

本剤は外用だけに使用し、内服やうがいには使用しないでください。  
又、目には入れないでください。

**大洋** 製造販売元  
**大洋製薬株式会社**  
東京都文京区本郷 3-14-16



使用期限  
各基準値

本剤の使用前に、この外箱の説明事項を必ずお読みください。また、必要なところを読みるよう大切に保管してください。

## △【使用上の注意】

### ※【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用があることがある)

- 1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
- 2) 患部が充血の人の人
- 3) 深い傷やひどいやけどの人

### ※【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- 1) 医師の治療を受けている人
- 2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- 3) 薬よりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること

- 1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤・かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさとともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる

- 2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

## 効能・効果

すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒

販売名: ボビエイド  
消毒剤 外用専用 50mL 指定医薬部外品

## 上手な使い方

液がこぼれても、大丈夫なところで消毒しましょう。  
消毒前によく手を洗いましょう。



● 傷を水道水などで洗浄し砂や異物を取り除いた後、傷に薬液をつけてます。



● 薬液を清潔な綿棒や綿球などで、傷と傷の周りを充分に囲う程度に(1cm以上を目安)伸ばします。

● 約30秒後に患部を水道水で軽く洗い流してから清潔なガーゼ等で水分を拭き取り、ぱんそくや傷保護剤で被ってください。

## 大洋製薬お客様相談窓口

0120-184328

受付時間 午前10時~午後5時(土・日曜・祝祭日は除く)



B10-TS