

本剤の使用前に、この説明事項を必ずお読みください。



使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
1) 医師の治療を受けている人 2) 次の症状のある人 口内のひどいだれ
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
口	刺激感


- 2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果 口腔内およびのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去。

用法・用量 1回約1mLを約50mLの水にうすめて、1日数回うがいをする。

使いやすいポンプ式 1押し1mL

一般に使われているコップ(200mL)に薬剤を1mL(1回押す)入れて、水(50mL:約1/4)でうすめます。その液でうがいをしてください。



(容器の使い方)

ポンプのストッパー(青色)を手前に引いて取りはずすと、ポンプが使用可能な状態になります。数回空押しをしてポンプ内に液がたまると、1回に1mL薬液が出るようになります。一度はずしたストッパーは再度使用しないでください。

指定医薬部外品

のどの殺菌 消毒

ヨード
不使用

リファレンザ[®] うがい薬

洗浄・口臭の除去

有効成分 CPC配合
(セチルビリジニウム塩化物水和物)

製造販売元



120mL
(約120回分) 大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16

販売名 CPCうがい薬 タイヨー

<用法・用量に関する注意>

- 1) 定められた用法・用量を厳守してください 2) 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させてください
- 3) うがい用にのみ使用し、内服しないでください 4) 原液のまま使用しないでください 5) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けてください

成分・分量 本品 100mL中

セチルビリジニウム塩化物水和物……250mg

添加物として、エタノール、キシリトール、DL-リンゴ酸、ステビアエキス、l-メントール、リン酸水素ナトリウム水和物、香料

保管及び取扱い上の注意

- 1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください(車内等、高温になるおそれのある所には置かないでください) 2) 小児の手が届かないところに保管してください 3) 他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります) 4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください

ポンプ、ボトル
外装フィルム

大洋製薬お客様相談窓口
0120-184328
受付時間 午前10時~午後5時(土・日曜、祝日除く)

製造番号

使用期限

4975175022057

L12-TS