

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

指定医薬部外品

口腔咽喉薬  
のどの痛み・はれに  
**リファレンザ® のどスプレー**

販売名：CPCのどスプレータイヨー

〔特 徴〕

1. 本製剤は、殺菌消毒成分・セチルピリジニウム塩化物水和物を含み、のどの炎症によるのどの痛みやのどのはれ等を抑えます。
2. お口の中に清涼感を与える *l*-メントールやキシリトール、リンゴ酸等の成分を含みます。
3. シュッと噴射するだけで、のどに直接とどき、効果を発揮します。
4. 携帯に便利なトップキャップ付の容器を使用しています。
5. エタノール、ヨードを含みません。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる)  
長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人  
(2)本人又は家族がアレルギー体質の人  
(3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(4)次の症状のある人  
口内のひどいただれ
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
口	刺激感
消化器	胃部不快感、はきけ

- (2)5～6日間使用しても症状がよくならない場合

〔効能・効果〕

のどの炎症によるのどの痛み、のどのはれ、のどのあれ、のどの不快感、声がれ

(必ず裏面もお読みください)

## 〔用法・用量〕

1日数回、適量をのどの粘膜面に噴射塗布してください

### 〈ご使用の目安〉

1回2～3噴射・1日3～6回を目安としてご使用ください

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください
- (2)小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させてください
- (3)噴射塗布用にはのみ使用し、内服しないでください
- (4)薬液を誤って大量に飲み込んだ場合には、直ちに医師の診療を受けてください
- (5)息を吸いながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、軽く息をはきながら噴射してください
- (6)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けてください
- (7)最初にお使いになるときは、薬液がでるまで数回空押しをしてください。この時、ティッシュ等に向けて吹き付ける様にし、液が周囲に飛び散らないように注意してください
- (8)ノズルの先端を針等で行くのは、大変危険ですのでおやめください

## 〔噴射容器の使い方〕



## 〔成分・分量〕 100m L 中

成 分	含 量
セチルピリジニウム塩化物水和物	0.3g

添加物:グリセリン、D-ソルビトール、プロピレングリコール、キシリトール、リン酸水素ナトリウム水和物、DL-リンゴ酸、*l*-メントール

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください  
(車内等、高温になるおそれのある所には置かないでください)
- (2)小児の手が届かないところに保管してください
- (3)他の容器に入れかえないでください  
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
- (4)使用後は、ノズル付近を清潔なティッシュペーパー等でふき、キャップをして保管してください
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください



製造販売元  
**大洋製薬株式会社**  
東京都文京区本郷3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口  
☎0120-184328  
受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)