

第3類医薬品

殺菌消毒剤

消エタスプレー・P

日本薬局方 消毒用エタノール

100mL



発売元

大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口
000120-184328
受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜・祝日除く)

副作用被害救済制度
0120-149-931

本剤の使用前に、この説明事項を必ずお読みください。

▲ 使用上の注意

【してはいけないこと】

- [守らないと現在の症状が悪化したり副作用がおこりやすくなる]
1. 軽くぬるだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないこと。(局所刺激作用があるため。)
2. 次の部位には使用しないこと。目や目の周囲、口唇等の粘膜の部分

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 患部が広範囲の人
(5) 深い傷やひどいやけどの人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品をもって医師又は薬剤師に相談すること。
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発赤、はれ、灼熱感等

(2) 5~6日間使用しても症状が良くならない場合

効能・効果 創傷面の殺菌・消毒

用法・用量 本液を脱脂綿、ガーゼ等に噴霧又は浸して患部に軽く塗る。

<用法・用量に関する注意> (1) 定められた用法を厳守すること。
(2) 外用にのみ使用し、内服しないこと。 (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。 (4) 小児に使用する場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用すること。

成 分

G08-FL
本品100mL中
日局エタノール83mLを含む。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること。
(2) 直射日光及び火気を避け保管すること。
(3) 振発性があるので、使用後はキャップをし、高温の場所には保管しないこと。
(4) 本液はニスを溶かすので、ニスの塗つてある建具や家具等には本液が付着しないように注意すること。
(5) 火気につづけないこと。又火気に向けて噴霧しないこと。
(6) 他の容器に入れかえないこと。

製造販売元

小堀製薬株式会社
東京都墨田区両国4-34-5

キャップ
ボトル
ポンプ
外装フィルム

火気厳禁、アルコール類、危険等級Ⅱ、水溶性

使用期限:

製造番号:

4975175011617