

第3類医薬品 収斂消炎剤

日本薬局方 チンク油

Zinc Oxide Oil
チンク油「コザカイ・P」 50g



発売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16
製造販売元
小堺製薬株式会社
東京都墨田区両国4-36-9

2012年4月改訂（記載要領変更に伴う改訂等）

ご使用前に際しては、この説明文書を必ずお読み下さい。
また必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなります。〕

1. 次の部位には使用しないでください。
重度又は広範囲のやけど

⊗ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 患部が広範囲の人
(4) 淫潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤・かゆみ等
3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。	

使用期限：

製造番号：

第3類医薬品

日本薬局方 チンク油 Zinc Oxide Oil

効能・効果

小範囲の湿疹、皮膚炎、やけどによる潮紅

用法・用量

1日1～数回、適量を直接患部に塗布する。

【上手なつかい方】

本剤を塗布した後はガーゼ等で覆ってください。必ずオリーブ油等で前回のチンク油をふき取ってからつけ直すようにします。オリーブ油でふき取れないようなびらん、潰瘍、熱傷には使用できませんのでご注意ください。

大洋製薬お客様相談窓口

☎ 0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時（土・日曜、祝日は除く）

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流してください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4) 油分が分離していることがありますので、よくかき混ぜて均一にしてからご使用ください。

成分

本品50g中、酸化亜鉛25gを含有します。添加物としてポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ダイズ油を含有します

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

E12-TS



4 975175 010504

紙 外箱 ㊦ キャップ 容器