

殺菌消毒剤

スキネード

医薬品

本剤の使用前に、この説明事項を必ずお読みください。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 患部が広範囲の人
 - 深い傷やひどいやけどの人
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

成分・分量

本品100mL中

塩酸ジブカイン	100mg
塩酸ナファゾリン	100mg
マレイン酸クロルフェニラミン	200mg
塩化ベンザルコニウム	100mg

保管及び取扱い上の注意

- 小児の手のとどかない所に保管すること
- 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

効能・効果

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、
創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

用法・用量

1日数回、患部に噴霧又はガーゼ、脱脂綿に浸して塗布する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守すること
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科専門医の診療を受けること
- 外用にのみ使用し、内服しないこと

【包装】80mL、120mL



キャップ：PP
ポンプ：PP
ボトル：PE
外装フィルム：PE

◎スキネード容器の使い方◎

キャップをはずし、患部に向けてノズルを押すと薬液が霧状に出ます。患部の周囲も洗い流す様に数回噴霧してください。

C07-FL



製造販売元

大洋製薬株式会社

東京都文京区本郷 3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)